

TÁJÉKOZTATÓ FEJSÉRÜLT GYERMEKEK SZÜLEI RÉSZÉRE

Gyermekének fejsérülését az orvosi vizsgálat során alacsony kockázatú csoportba sorolták, azért a kórházi felvétel és obszervációja nem vált szükségessé, de otthonában fejsérülést követő 24-48 órában szoros megfigyelése, ellenőrzése szükséges.

Alacsony energiájú baleseti mechanizmus esetén eszméletvesztés nélkül, rövid szédülés, enyhe fejfájás, egyszeri hányás esetén koponyatörés tünetei nélkül a gyermekek bizonyos feltételek mellett kezelhetők, megfigyelhetők a saját otthonukban. Kezdeti tünetmentesség esetén is ritkán a lassan kialakuló koponyán belüli vérzés, agyszövet duzzanat életveszélyes szövődményeket, helyzetet okozhat.

FEJFÁJÁS: gyermeke fejét enyhén fájlalhatja, adhat neki Panadolt (Paracetamol), Nurofent (Ibuprophen) 4-6 óránként az orvos/gyógyszer utasítása szerint illetve kövesse a mellékelt utasítást. *Romló, erősödő fejfájás koponyán belüli károsodás jele lehet.*

HÁNYÁS: gyermeke fejsérülést követően 1x hányhat.

Az ismétlődő hányás koponyán belüli károsodás jele lehet.

ALUSZÉKONYSÁG: közvetlenül a fejsérülést követően gyermeke kissé fáradt lehet. Nem szükséges a gyermeket ébren tartani, ha a gyermek aludni szeretne. Azonban ébressze fel 30-60 percenként, hogy ellenőrizhesse a reakcióját az ismerős emberekre és dolgokra.

Ha a gyermeke nehezen / nem ébreszthető, az koponyán belüli károsodás jele lehet.

Haladéktalanul keresse fel a gyermekét ellátó gyermek baleseti sebészeti kórházat, osztályt, ambulanciát, amennyiben gyermeke:

- ☹ viselkedése szokatlan vagy zavart,
- ☹ fejfájása súlyos, szokásos fájdalomcsillapítókra nem múlik,
- ☹ fejsérülést követően hosszabb ideig nyugtalan, vigasztalhatatlanul síró csecsemő,
- ☹ ismételten, többször hány,
- ☹ füléből, orrából, szájából vérzést tapasztal,
- ☹ görcsöl, görcsrohama van, arcát, kezét vagy lábát feszíti,
- ☹ nehezen ébreszthető, nehezen marad ébren,
- ☹ látászavara van (homályos vagy kettős látás), pupillái nem egyenlő méretűek,
- ☹ beszéde elmosódott,
- ☹ vagy bármilyen okból aggódik.

Az otthonában történő megfigyelés, folyamatos észlelés során a szülő, hozzátartozó felelőssége és kötelezettsége a gyermek állapotának észlelése és megítélése. A legkisebb kétely esetén is az ismételt orvosi vizsgálat, illetve kórházi felvétel a gyermek érdekét, biztonságát szolgálja. Csak akkor obszerválható a gyermek otthonában, ha a fenti tünetek jelentkezését követően 30 percen belül a kórházba vissza tudják hozni. Rendkívüli helyzet esetében hívja a mentőket a 112-es telefonszámon.